

(3)大豆奨励品種特性表

種 類	早 中 晩	区 分 (銘柄)	品 種 名	来 歴 (育 成 場 所 年 次)	採 用 年 次	栽 培 面 積 (令6)	供 試 年 次	播 種 期 次	開 花 期 次	成 熟 期 次	生 態 型	主 茎 長	分 枝 数	主 茎 節 数	葉 型	伸 長 (草 型)	毛茸の有無及び色	花 色	熟 色	裂 莢 性
大 豆	中 の 中	中 粒 白 目	タマホマレ	Lee×東山7号 (フジミジロ) (長野総農試 中信試 昭和55年)	年 昭55	ha 0	年 平18 ↳ 平22	月.日 6.26	月.日 8.05	月.日 11.01	ⅢC	cm 53.2	本 4.0	節 12.3	中	有限	白	紫	褐	難
	中 の 晩	中 粒 褐 目	フクユタカ	岡大豆× 白大豆3号 (九州農試 昭和55年)	年 昭61	347	令1 ↳ 令5	月.日 7.07	月.日 8.20	月.日 11.08	ⅣC	cm 74.2	本 4.3	節 14.8	円	有限	白	紫	淡 褐	中
	晩 の 早	大 粒 黒大豆	丹 波 黒	兵庫農試より 取寄せ (大正13年)	年 昭3	-	昭48 ↳ 昭52	月.日 6.21	月.日 8.12	月.日 11.27	ⅣC	cm 67	本 4.2	節 14.0	中	有限	褐	紫	褐	中

子 実					粗 蛋 白 質	粗 脂 肪	病害虫抵抗性				環 境 抵 抗 性					適 地	栽 培 適 性	概 評							
百 粒 重	粒 形	裂 皮	種 皮 色	臍 色			10 a 当 た り	収 量	紫 斑 病	ウ イ ル ス 病	カ メ ム シ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	密 植 適 応 性	耐 肥 性	耐 倒 伏 性			耐 湿 性	蔓 化 の 難 易	選 播 適 応 性	優 点	欠 点			
31.8	g 球		微 少	黄	黄	471	kg	41.6	%	20.5	%	中	中	中	中	大	強	強	中	難	中	県 下 全 域	転換畑 向 き	早 熟 多 良 収 質 機械 収穫 に適 する	紫斑病 弱
34.4	球	少		黄 白	淡 褐	530		44.6		20		強	中	中	中	中	中	中	中	中	大	県 下 全 域	畑作及 び転換 畑向き	多 収 良 質 高蛋白	耐倒伏性 中
45.8	扁 球	多		黒	暗 褐	256		—		—		—	弱	中	中	中	中	弱	中	易	大	県 下 全 域	畑作及 び転換 畑向き	煮 豆 用 多 収	倒伏・ 蔓化が 易 ウイルス 病弱 裂皮多

(注:タマホマレ・フクユタカは転換畑、丹波黒は畑にて調査)