

## 安定ヨウ素剤予防服用に関する問診票

ふりがな			性別	男・女
氏名				
生年月日	年	月	日	年齢
住所				

### ○ 安定ヨウ素剤について

**【服用の効果】**

原子力災害により放出される放射性物質のうち、放射性ヨウ素による甲状腺への内部被ばくを低減する効果があります。

**【服用のタイミング】**

服用効果を十分に得るためには、服用のタイミングが重要です。  
国または地方公共団体の服用指示があった時に、適切な量を服用してください。

**【服用対象者】**

服用を優先すべき対象者は、「妊婦、授乳婦及び未成年者（乳幼児含む）」です。  
なお、WHOガイドライン2017年版では、40歳以上の者への服用効果は、ほとんど期待できないとされています。

**【副作用】**

安定ヨウ素剤の1回の服用では、副作用を生じる可能性は極めて低くなります。  
ただし、新生児については、服用後数日以降の経過観察が必要です。

### A 服用不適切項目の該当

今までに、以下のお薬や食べ物で、かゆみ、吐き気、発熱、腹痛、頭痛、皮膚が赤くなる などのアレルギー反応を経験したことがありますか？

安定ヨウ素剤、うがい薬、消毒薬、ヨード造影剤、昆布、昆布だし、ところてん、海苔 など

※ どちらかにチェックしてください

該当しない    該当する

                    

### B 安定ヨウ素剤服用の希望

希望する    希望しない

                    

### C 妊婦・授乳婦の該当

現在妊娠中、又は授乳中ですか？  
※妊娠の可能性のある方を含みます

該当しない    該当する

                    

**【配布状況】** ※以下は自治体が記入します。

<input type="checkbox"/> 丸薬	<input type="checkbox"/> 1丸（3歳以上13歳未満）	<input type="checkbox"/> 2丸（13歳以上）
<input type="checkbox"/> 内服液	<input type="checkbox"/> 1ml: 生後1か月未満	<input type="checkbox"/> 2ml: 生後1か月以上3歳未満
	<input type="checkbox"/> 3ml: 3歳以上13歳未満	<input type="checkbox"/> 6ml: 13歳以上
<input type="checkbox"/> ゼリー剤	<input type="checkbox"/> 生後1か月未満(16.3mg 1包)	<input type="checkbox"/> 生後1か月以上3歳未満(32.5mg 1包)