

各関係機関・団体長 様

愛媛県病害虫防除所長

病害虫発生予察情報について（送付）
このことについて、4月の予察情報を送付します。

病害虫発生予報（4月）

令和 8 年 3 月 31 日
愛 媛 県

1 予報の概要

作物名	病害虫名	発生量	その他
麦類	赤かび病	並	
かんきつ	かいよう病 そうか病 ミカンハダニ	やや少～並 並～やや多 やや多～多	
かき	炭疽病	並～やや多	
キウイフルーツ	かいよう病	-	発生時期：早
果樹共通	果樹カメムシ類	並	飛来時期：早
冬春トマト	灰色かび病 タバココナジラミ オンシツコナジラミ	並～やや多 並～やや多 並～やや多	
冬春きゅうり （促成栽培）	べと病 灰色かび病	やや多～多 並～やや多	
冬春きゅうり （半促成栽培）	べと病	並～やや多	
冬春いちご	うどんこ病 灰色かび病 ハダニ類 アザミウマ類 タバココナジラミ オンシツコナジラミ	並～やや多 やや多～多 やや多 やや少～並 多 並	
たまねぎ	べと病	並	

2 気象予報（高松地方气象台）

1 か月予報 3月19日発表（3月21日～4月20日）

< 予報のポイント >

- ・向こう1か月の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高いでしょう。
- ・低気圧や前線の影響を受けやすいため、向こう1か月の日照時間は少なく、降水量は平年並か多いでしょう。
- ・昨年11月中旬から低気圧や前線の影響を受けにくく、降水量の少ない状態となっています。向こう1か月の降水量は平年並か多い見込みですが、少雨の影響が残る可能性があります。

< 1か月の平均気温・降水量・日照時間 >

	平均気温（1か月）	降水量（1か月）	日照時間（1か月）
四国地方	低 10 並 10 高 80% 高い見込み	少 20 並 40 多 40% 平年並か多い見込み	少 50 並 30 多 20% 少ない見込み

3 病害虫の発生予想

麦 類

(1) 赤かび病

ア 予報の内容 発生量：並

イ 予報の根拠

(ア) 3月第4～5半旬の子のう胞子の飛散調査では西条市丹原町、松山市上難波ともに飛散量は平年より少ない（表1）。

(イ) 気象予報では、気温は高い、降水量は平年並か多いとされており、発生にやや助長的である。

表1 麦赤かび病子とう胞子飛散調査結果

調査地点	3月第4半旬		3月第5半旬	
	本年	平年	本年	平年
西条市丹原	0	7.3	1	8.6
松山市上難波	0	21.9	0	19.2

※平年：R7～H28年の10年間の平均

ウ 防除上の注意

- (ア) 裸麦（品種：ハルヒメボン）の出穂期は、昨年より早くなる見込みである（11/20で3/15、12/1で3/20、12/10で3/24と予想されている（農林水産研究所））。本病が最も感染しやすい時期は、出穂から4～5日経過後の開花始期からほぼ10日間であり、この時期に温暖で降雨があると子とう胞子の飛散量が増加し、感染に好適となる。
- (イ) 子とう胞子の飛散は、湿度80%以上、気温15℃以上が1時間以上続く場合に増加する。
- (ウ) 防除適期は開花期（裸麦：出穂5～7日後、小麦：出穂7～10日後）であり、開花期に必ず防除を行う。
- (エ) 開花期以降も、温暖で雨（湿潤）が続くようであれば、二次感染が助長されるため、開花期の防除から7～10日後に追加防除を実施する。
- (オ) トップジンM剤の適用登録の使用回数は、大麦では出穂期以降1回以内、小麦では出穂期以降2回以内となっているため、散布に際して注意する。
- ※ 令和8年の子とう胞子飛散状況は病害虫防除所ホームページの「調査データ」に掲載していません（3月16日より計測開始）。

かんきつ

(1) かいよう病

ア 予報の内容 発生量：やや少～並

イ 予報の根拠

- (ア) 2月に行った越冬病斑量調査の結果、伊予柑では発生園地率、発病度は少、甘平では発生園地率は平年並、発病度はやや少の発生であった。
- (イ) 気象予報では、気温は高い、降水量は平年並か多いとされており、発生にやや助長的である。

ウ 防除上の注意

- (ア) 夏秋梢などの罹病枝葉を除去し、園地の病原菌密度を下げる。
- (イ) 強風により付傷すると発病が助長されるため、防風垣や防風ネットによる対策を行う。
- (ウ) 多発園地では、新葉への感染防止対策として、開花前（4月中～下旬）に薬剤防除を行う。

(2) そうか病

ア 予報の内容 発生量：並～やや多

イ 予報の根拠

- (ア) 常発地における3月の越冬病斑量調査の結果では、発病葉率、発病度ともに概ね平年並の発生であるが、発生程度の高い園地も見られる（表2）。
- (イ) 気象予報では、気温は高い、降水量は平年並か多いとされており、発生にやや助長的である。

ウ 防除上の注意

- (ア) 罹病枝葉を除去し、園地の病原菌密度を下げる。
- (イ) 展葉初期（新梢長約1cm）の防除の効果が高いため、圃場観察を行い、適期を逃さないようにする。

表2 カンキツそうか病の越冬病斑調査結果（3月調査）

調査園地	発病葉率	発病度
中予①	35.75	17.35
中予②	4	1.6
南予①	0	0
南予②	0	0
南予③	0	0
南予④	0	0
南予⑤	3.5	1.1
全県	6.18	2.86
平年	1.16	0.45

※平年：R7～H30年の8年間の平均

(3) ミカンハダニ

ア 予報の内容 発生量：やや多～多

イ 予報の根拠

(ア) 3月中旬の調査では、寄生葉率、1葉当たりの雌成虫数ともにやや多の発生である。

(イ) 気象予報では、気温は高い、降水量は平年並か多いとされており、発生にやや助長的である。

ウ 防除上の注意

(ア) 冬季にマシン油乳剤を散布していない園地では、密度が急激に高まることがあるので、圃場観察を行い、密度が高まる前に防除を行う。

かき

(1) 炭疽病

ア 予報の内容 発生量：並～やや多

イ 予報の根拠

(ア) 3月の越冬病斑量調査の結果では、発生園地率、発生枝率ともに平年並の発生である(表3)。

(イ) 気象予報では、気温は高い、降水量は平年並か多いとされており、発生にやや助長的である。

ウ 防除上の注意

(ア) 越冬病斑のある枝を除去し、園地内の病原菌密度を下げる。また、切除した枝は園地内に放置せず、適切に処分する。

表3 カキ炭疽病の越冬病斑調査結果(3月調査)

調査園地数	発生園地率 (%)		発生枝率 (%)	
	本年	平年	本年	平年
56	14.3	14.4	0.3	0.6

※平年：R7～H28年の10年間の平均

キウイフルーツ

(1) かいよう病

ア 予報の内容 発生時期：早

イ 予報の根拠

(ア) 3月中旬の調査(品種：ヘイワード、18園地)では、1園地で枝幹部からの赤褐色の樹液漏出を確認しており、1樹当たりの漏出個所数(R8.3月：0.07か所/樹、平年：0.05か所/樹)は平年並である。

(イ) 気象予報では、気温は高い、降水量は平年並か多いとされており、発生にやや助長的である。

ウ 防除上の注意

(ア) 園地の見廻りを徹底し、赤褐色の樹液漏出、芽枯れ、葉の斑点等の発生の有無を確認する。

(イ) 発生確認後は、周辺樹への拡散防止のため、発病部の早期除去を行う。

伐採基準は、「キウイフルーツかいよう病Psa3型の防除方針」に基づき発病程度に応じて適切に対応する。

(ウ) 強風雨による枝葉の付傷は感染を拡大させるため、園地の防風対策を強化するとともに、発生園地やその周辺園地では、強風雨前後には抗生物質剤により応急防除を行う。

(エ) 新梢への感染防止のため、発芽後叢生期(新梢長約10cm)までに防除を行う。なお、銅水和剤については、開花直前～開花1週間後は受粉等に影響があるので散布は避ける。

果樹共通

(1) カメムシ類(うめ、もも、びわ、キウイフルーツ、なし等)

ア 予報の内容 発生量：並 果樹園への飛来時期：早

(令和8年3月12日付け令和7年度病害虫防除技術情報(第9号)参照)

野菜

(1) べと病(冬春きゅうり)

ア 予報の内容 発生量：促成栽培 やや多～多

発生量：半促成栽培 並～やや多

イ 予報の根拠

(ア) 3月中旬の調査では、促成栽培ではやや多、半促成栽培では発生を認めていない。

(イ) 気象予報では、気温は高い、降水量は平年並か多いとされており、発生にやや助長的である。

ウ 防除上の注意

(ア) ハウス内の換気に努め、多湿を防ぐ。

(イ) 草勢の低下は発病を助長するので、適正な肥培管理に努める。

- (ウ) 老化葉はできるだけ除去し、圃場内の通風を図る。伝染源を減少させるため多発葉を除去する。
- (エ) 発病初期の防除に重点を置き、薬剤が葉裏の菌叢までかかるよう散布する。また、病勢が進展している場合は、治療効果の高い薬剤を散布する。
- (2) コナジラミ類 (冬春トマト、冬春いちご)
- ア 予報の内容 発生量：冬春トマト タバココナジラミ 並～やや多、オンシツコナジラミ 並～やや多
発生量：冬春いちご タバココナジラミ 多、オンシツコナジラミ 並
- イ 予報の根拠
- (ア) 3月中旬の調査では、冬春トマトではタバココナジラミ、オンシツコナジラミともに発生を認めておらず、冬春いちごではタバココナジラミはやや多、オンシツコナジラミはやや少の発生である。
- (イ) 気象予報では、気温は高いとされており、発生に助長的である。
- ウ 防除上の注意
- (ア) 薬液が葉裏までかかるよう散布する。
- (イ) 本虫は、多くの植物に寄生するため圃場内外の除草を行う。
- (ウ) トマトではタバココナジラミはトマト黄化葉巻ウイルス (TYLCV) を、両種はトマト退緑ウイルス (ToCV) を媒介するので注意する。また、ウイルス病発病株は早期に抜き取り適切に処分する。
- (3) ハダニ類 (冬春いちご)
- ア 予報の内容 発生量：やや多
- イ 予報の根拠
- (ア) 3月中旬の調査では、平年並の発生である。
- (イ) 気象予報では、気温は高いとされており、発生に助長的である。
- ウ 防除上の注意
- (ア) 気温上昇に伴い増殖が早まるので注意する。
- (イ) 圃場を観察して早期発見に努め、発生がみられたら早めに防除する。また、同一系統の薬剤の連用を避け、気門封鎖剤を含めローテーション使用する。
- (ウ) 薬剤散布に当たっては、ミツバチや天敵への影響を考慮して薬剤を選択する。また、摘葉を行い、薬液が葉裏にかかるよう散布する。
- (4) アザミウマ類 (冬春いちご)
- ア 予報の内容 発生量：やや少～並
- イ 予報の根拠
- (ア) 3月中旬の調査では、寄生花率、1花当たりの虫数ともにやや少の発生である。
- (イ) 気象予報では、気温は高い、降水量は平年並か多いとされており、発生にやや助長的である。
- ウ 防除上の注意
- (ア) 気温の上昇に伴い、ハウス外からの侵入が増加してくる時期となるので、圃場内の発生に注意する。
- (イ) 花や幼果に寄生するため、圃場観察を行い、早期発見に努め、発生がみられたら早めに防除する。
- (ウ) 薬剤散布に当たっては、ミツバチや天敵への影響を考慮して薬剤を選択する。
- (5) 灰色かび病 (冬春トマト、冬春いちご、冬春きゅうり)
- ア 予報の内容 発生量：冬春トマト 並～やや多
発生量：冬春いちご やや多～多
発生量：冬春きゅうり (促成栽培) 並～やや多
- イ 予報の根拠
- (ア) 3月中旬の調査では、冬春トマトは平年並、冬春いちごはやや多、冬春きゅうりでは発生を認めていない。
- (イ) 気象予報では、気温は高い、降水量は平年並か多いとされており、発生にやや助長的である。
- ウ 防除上の注意
- (ア) 換気を図り、ハウス内の多湿を防止する。
- (イ) 過繁茂や軟弱な生育は発病を助長するので、適正な肥培管理に努める。
- (ウ) 発病果や枯死茎葉は早めに除去する。
- (6) うどんこ病 (冬春いちご)
- ア 予報の内容 発生量：並～やや多
- イ 予報の根拠

- (ア) 3月中旬の調査では、葉・果実ともに平年並の発生である。
- (イ) 気象予報では、気温は高い、降水量は平年並か多いとされており、発生にやや助長的である。
- ウ 防除上の注意
- (ア) 伝染源となる発病葉・発病果や古葉はできる限り除去し、通風と薬剤の付着性を高める。
- (イ) 果実発病が中心となるため、発病初期の防除に重点を置く。
- (ウ) 薬剤散布に当たっては、展着剤を加用し、葉裏や芽の間隙部に薬剤が付着するよう散布する。
- (7) ベと病 (たまねぎ)
- ア 予報の内容 発生量：並
- イ 予報の根拠
- (ア) 3月中旬の広域調査では、発生圃場率、発病株率ともに平年並の発生である (表4)。
- (イ) 気象予報では、気温は高い、降水量は平年並か多いとされており、発生にやや助長的である。
- ウ 防除上の注意
- (ア) 越年罹病株 (葉の黄化・色あせ、草丈が小さく葉身に粉状の灰褐色の分生子が付着した株) は見つけ次第早期に抜き取り処分する。
- (イ) 球の肥大期になると感受性が高まり、葉身に淡黄緑色の楕円形の病斑が出始めるため、圃場観察を行い、早期発見に努め、発病初期に治療効果のある薬剤で防除を行う。
- (ウ) 気温が15℃前後で曇雨天が続くと多発しやすいので、このような気象条件では注意する。

表4 広域調査におけるたまねぎべと病の発生調査結果 (普通期)

地域	調査圃場数	発生圃場数	発生圃場率 (%)		平均発病株率 (%)	
			本年	平年	本年	平年
東予	46	10	21.7	21.1	0.5	1.4
中予	52	0	0	9.1	0	0.2
南予	9	0	0	9.7	0	1.8
全県	107	10	9.3	14.2	0.2	1.0

※平年：R7～H29年の9年間の平均

【病害虫発生予察情報】

愛媛県病害虫防除所ホームページでご覧になれます。

ホームページアドレスは、<https://www.pref.ehime.jp/site/byocyubojo/>

【農薬使用時の注意】

- ◎農薬の選定にあたっては、農薬取締法に基づき登録された農薬から選定しましょう。
- ◎農作物の安全性を確保するため、農薬の使用にあたっては、適用作物、使用回数、使用時期、使用濃度、使用量、使用方法等の使用基準を遵守しましょう。
- ◎病害虫等の発生を的確に把握し、適時適切な経済防除に努め、農薬や労力等の低投入を図るとともに、低毒性農薬を使用しましょう。
- ◎農薬による防除のみに頼らず、耕種的防除法、物理的防除法及び天敵導入等を積極的に取り入れた総合防除を推進しましょう。
- ◎同一薬剤の連用は耐性菌、抵抗性害虫の出現や助長をまねくので、農薬のローテーション使用を心掛けましょう。
- ◎農薬の使用にあたっては、当該散布場所の地形、当日の気象、養蚕、養蜂、その他の環境条件を考慮し、周辺環境に影響の少ない薬剤を選定するとともに、危害の未然防止や環境の保全に努め、農薬事故防止対策を徹底しましょう。
- ◎農薬を使用する際、農薬のラベルに記載された登録内容、使用上の注意事項等を遵守し、農薬の散布にあたっては、農薬の種類に応じた保護具を必ず装着しましょう。
- ◎農薬の保管管理や取り扱いに注意し、紛失、盗難等の未然防止を図りましょう。