

3 愛防第 19-1 号
令和 3 年 5 月 31 日

各関係機関・団体長様

愛媛県病害虫防除所長

病害虫発生予察情報について（送付）

このことについて、6月の予察情報を送付します。

病害虫発生予報（6月）

令和 3 年 5 月 31 日
愛 媛 県

1 気象予報(高松地方気象台)

1か月予報 5月 27 日発表 (5月 29 日～6月 28 日)

〈 1か月の平均気温・降水量・日照時間 〉

	平均気温(1か月)	降水量(1か月)	日照時間(1か月)
四国地方	低 20 並 30 高 50% 高い見込み	少 30 並 40 多 30% ほぼ平年並の見込み	少 40 並 30 多 30% ほぼ平年並の見込み

〈 予報のポイント 〉

暖かい空気が流れ込みやすいため、向こう 1か月の気温は高いでしょう。

2 病害虫の発生予想

水 稲

(1) いもち病 (葉いもち)

ア 予報の内容 発生量：やや多
イ 予報の根拠

(ア) 早期水稻の定点調査では発生は認められていないが、山間部の圃場では置き苗及び本田での発生が認められている。

(イ) 梅雨入り後、BLASTAM による葉いもち感染好適条件及び準感染好適条件の出現が県内(15 地点)の複数地点で認められている（病害虫防除所ホームページ掲載データを参照）。

(ウ) 気象予報では、気温は高い、降水量はほぼ平年並、日照時間はほぼ平年並とされ、現在の発生傾向が続くものとみられる。

ウ 防除上の注意

(ア) 育苗時の多湿は、苗いもちの発病を助長させて育苗管理に注意をする。また、本田に発病苗を持ち込まないよう早期発見に努める。

(イ) 本田の窒素質肥料の過用は、発病を助長するので適正施肥に努める。

(ウ) 本田の置苗は葉いもちの発生源となるので、補植後は水田内に放置しない。

(エ) 常発地や罹病性品種を栽培する場合は、本病に適用のある育苗箱施用剤を必ず処理する。

(オ) 本病は耐性菌が出現することがあるので、育苗箱施用剤の処理後も本田発病に注意する。

(2) ウンカ・ヨコバイ類

ア 予報の内容 発生量：並～やや多
イ 予報の根拠

(ア) 畦畔及び本田の探し取り調査では、ウンカ・ヨコバイ類は認められなかった。

(イ) 現在、予察灯でのセジロウンカ、トビイロウンカの誘殺は確認されていない。

(ウ) 気象予報では、気温は高いとされており、発生に助長的である。

ウ 防除上の注意

(ア) ヒメトビウンカは畦畔・休閑田の雑草地に生息するので田植えまでに除草を行う。

(イ) セジロウンカ、トビイロウンカは、梅雨前線に沿って飛来すると予想されるので、移植時の育苗箱施用剤は必ず処理し、本田での初期防除を徹底する。

(3) イネミズゾウムシ

ア 予報の内容 発生量：多
イ 予報の根拠

(ア) 4月下旬～5月上旬移植の水稻調査では、成虫による被害及び25 株当たり成虫数は多である。

(イ) 久万高原町設置の予察灯では、5月16日に48頭と多く誘殺されている。

(ウ) 気象予報では、気温は高いとされており、発生に助長的である。

ウ 防除上の注意

(ア) 常発地で今後田植えする地域では、本虫に登録のある育苗箱施用剤を処理する。

(イ) 成虫の水田への侵入を防止するため、水田の畦畔際に障壁（あぜなみシート等）を設置する。

(ウ) 本虫に有効な育苗箱施用剤を処理していない圃場で発生量が多い場合には本田防除を行う。

かんきつ

(1) かいよう病

ア 予報の内容 発生量：並～やや多

イ 予報の根拠

(ア) 2月の伊予柑を対象に行なった越冬病斑の調査では、発生は並である。

(イ) 5月中旬の新葉での調査では、伊予柑での発生を確認している。

(ウ) 気象予報では、気温は高い、降水量はほぼ平年並とされており、発生にやや助長的である。

ウ 防除上の注意

(ア) 園地の病原菌密度を下げるため、発病枝葉をできるだけ除去する。

(イ) 強風により付傷すると発病が助長されるため、防風垣や防風ネットを整備する。

(ウ) 幼果の感染防止のため薬剤防除を徹底する。

(エ) ミカンハモグリガの食害痕等の傷口が病原細菌の侵入箇所となるので防除を徹底する。

(オ) 本病に対して感受性の高い品種では防除を徹底する。

(2) そうか病

ア 予報の内容 発生量：多

イ 予報の根拠

(ア) 3月の越冬病斑の調査では、発病葉率、発病度ともに高い。

(イ) 5月中旬の調査では、多くの発生である。

(ウ) 気象予報では、降水量はほぼ平年並とされており、現在の発生傾向が続くものとみられる。

ウ 防除上の注意

(ア) 罹病枝葉の除去を徹底する。

(イ) 常発園、幼木園、高接ぎ更新園の温州みかんでは発病に注意し、梅雨期間中も発生は拡大するので防除を徹底する。フロンサイド剤を使用する場合は皮膚かぶれに注意する。

(ウ) 発病葉の多い園地では6月中～下旬に追加防除を行う。

(3) 黒点病

ア 予報の内容 発生量：並

イ 予報の根拠

(ア) 気象予報では、降水量はほぼ平年並とされている。

ウ 防除上の注意

(ア) 枯死枝の除去を徹底する(園内に放置している剪定枝も含む)。

(イ) 開花後から定期的な防除を行うが、累積降水量や散布後日数に応じて次回防除を実施する。マニゼブ剤およびマンネブ剤の散布間隔は累積降水量が200～250mm（または散布後30日）とし、本病に弱い‘せとか’、‘河内晩柑’、‘清見’等では散布間隔を短くする。

(4) ミカンハダニ

ア 予報の内容 発生量：やや多

イ 予報の根拠

(ア) 5月中旬の調査では、寄生葉率はやや多、1葉当たり雌成虫数は並の発生である。

(イ) 気象予報では、気温は高い、降水量はほぼ平年並とされており、発生にやや助長的である。

ウ 防除上の注意

(ア) 園内の早期多発樹で、1葉当たりの雌成虫が平均2～3頭に達した時期が防除の目安となる。

(イ) 薬剤は掛けむらのないように丁寧に散布する。

(5) ヤノネカイガラムシ

(病害虫防除技術情報(第1号) 令和3年5月14日付け) 参照

ア 予報の内容 発生時期：早

発生量：やや少～並

イ 予報の根拠

(ア) 5月中旬の調査では、やや少の発生である。

(イ) 定点調査での第1世代幼虫の初発は、5～7日早い(病害虫防除所ホームページ参照)。

- (ウ) 気象予報では、気温は高いとされており、発育がやや早くなるとみられる。
- ウ 防除上の注意
- (ア) 防除時期は幼虫初発の30~35日後であるが、アプロード剤は20~25日後とする。なお、初発以降、気温はやや高く推移していることから防除時期もやや早まっていると考えられるため、遅れないようとする。
- (イ) アプロード剤、スプラサイド剤の感受性低下が疑われる園地では、他系統の薬剤を使用する。

か き

(1) 炭疽病

ア 予報の内容 発生量：やや少

イ 予報の根拠

- (ア) 3月の結果母枝の越冬病斑量は少の発生である。
- (イ) 5月中旬の調査では、新梢での発生は確認されていない。
- (ウ) 気象予報では、降水量はほぼ平年並とされており、現在の発生傾向が続くものとみられる。

ウ 防除上の注意

- (ア) 発病には品種間差が大きく、「横野」、「早秋」、「富有」は罹病しやすい。
- (イ) 発病枝が感染源となるため園地内をこまめに観察し、早期に除去する。
- (ウ) 梅雨期は感染しやすいため、徒長枝等での発病に注意し薬剤防除を徹底する。

(2) うどんこ病

ア 予報の内容 発生量：多

イ 予報の根拠

- (ア) 5月中旬の調査では、多の発生である。
- (イ) 気象予報では、気温は高い、降水量はほぼ平年並とされており、現在の発生傾向が続くものとみられる。

ウ 防除上の注意

- (ア) 梅雨期の薬剤防除を徹底し、丁寧に散布する。

(3) カキノヘタムシガ

ア 予報の内容 発生時期：やや早

イ 予報の根拠

- (ア) 定点における越冬成虫の発生調査では、宇和島で5月第3半旬に成虫を確認した。発蛾最盛期は少発生のため明確でないが、5月第4半旬頃と推定される。

ウ 防除上の注意

- (ア) 第1世代幼虫に対する1回目の防除時期は南予で5月第6半旬~6月第1半旬、東予・中予では6月第1半旬~第2半旬頃と予想される。なお、例年、被害果の多い園地では、1回目防除の2週間後に2回目を行う。

(4) フジコナカイガラムシ

ア 予報の内容 発生量：やや多

イ 予報の根拠、

- (ア) 5月中旬の調査では、並の発生である。
- (イ) 気象予報では、気温は高い、降水量はほぼ平年並とされており、発生にやや助長的である。

ウ 防除上の注意

- (ア) 幼虫の発育が比較的揃いやすい第1世代幼虫期（6月中旬）の防除を重点に行う。
- (イ) 多発園地では1回目の防除3週間後に2回目を行う。

キウイフルーツ

(1) かいよう病

ア 予報の内容 発生拡大注意

イ 予報の根拠

- (ア) 5月中旬の調査では、葉の発生は昨年の同時期の調査と比較すると、発病度で約3.2倍、発病葉率で約2.6倍と発生程度は高い傾向である。
- (イ) 気象予報では、気温は高い、降水量はほぼ平年並とされており、高温期に入り増殖期ではないが、降雨による感染は継続するものとみられる。

ウ 防除上の注意

- (ア) 園地見回りによって、枝枯れの発生や枝幹部からの樹液漏出痕が確認された場合、周辺への拡散防止のため、発病部位の早期除去を行う。
- (イ) 伐採は、平成31年3月改訂の「キウイフルーツかいよう病Psa3型の防除方針」に基づき発病程度に応じて適切に対応する。

- (ウ) 梅雨明けまでは定期防除を行う。薬剤はコサイド3000の2,000倍等（薬害軽減のため、炭酸カルシウム剤200倍を加用）を使用する。
- (エ) 強風雨後、既発生園や発病園地の近くでは、樹体損傷による感染防止のため、抗生物質剤のアグレプト水和剤1,000倍（使用時期：収穫90日前まで4回以内）、マイシン20水和剤1,000倍（使用時期：収穫90日前まで4回以内）またはカスミン液剤400倍（使用時期：収穫90日前まで4回以内）のいずれかを使用する。なお、収穫時期の早い赤系品種等では薬剤の使用時期に留意する。

果樹共通

- (1) カメムシ類（うめ、もも、キウイフルーツ、なし、すもも、かんきつ、かき等）
 - ア 予報の内容 発生量：やや多 園地への飛来時期：やや早
 - イ 予報の根拠
 - (ア) 集合フェロモントラップによる誘殺数は松山市上難波、鬼北町興野々の地点で平年よりやや多く、予察灯における誘殺数では愛南町で平年より多い傾向である（病害虫防除所ホームページ参照）。
 - (イ) 気象予報では、気温は高い、降水量はほぼ平年並とされており、発生にやや助長的である。
 - ウ 防除上の注意
 - (ア) 夜温の高い日に飛来が多く見られる傾向があるため、もも、なし等の有袋栽培では被害防止のため早めに袋掛けをする。
 - (イ) 山林に近い園地に集中飛来する傾向があるので特に注意する。

野菜

- (1) うどんこ病（いちご育苗床）
 - ア 予報の内容 発生量：並～やや少
 - イ 予報の根拠
 - (ア) 5月中旬の調査では、栽培ハウス内での発生は並である。
 - (イ) 気象予報では、気温は高い、降水量はほぼ平年並とされており、発生にやや抑制的である。
 - ウ 防除上の注意
 - (ア) 葉の過繁茂は発病を助長し、薬剤の付着が悪くなるため下葉は適宜除去する。
 - (イ) 葉裏を十分に観察し、発病初期の防除を行う。薬剤散布は、薬液がランナーの先端部や葉裏までかかるように丁寧に行う。発病によって葉が巻き上がるまで放置しないように注意する。
- (2) 炭疽病（いちご育苗床）
 - ア 予報の内容 発生量：並～やや多
 - イ 予報の根拠
 - (ア) 県内では罹病性品種が多く栽培されている。
 - (イ) 気象予報では、気温は高い、降水量はほぼ平年並とされており、発生にやや助長的である。
 - ウ 防除上の注意
 - (ア) 婆潤の見られる親株は直ちに除去し、ランナー、小葉に病斑がみられる場合でも株ごと廃棄し伝染源を減らす。
 - (イ) 育苗時の主な発病時期は8～9月であるが、ランナー発生時期から定期防除を実施し、親株から子苗への感染防止（予防）に努める。
- (3) ミナミキイロアザミウマ（夏秋きゅうり、露地なす）
 - ア 予報の内容 発生量：やや多～多
 - イ 予報の根拠
 - (ア) 冬春きゅうりにおけるミナミキイロアザミウマの発生は東・中予で多、南予で並であり、今後収穫終了に伴う施設からの飛び出しは東・中予では多いと推察される。
 - (イ) 気象予報では、気温は高い、降水量はほぼ平年並とされており、発生に助長的である。
 - ウ 防除上の注意
 - (ア) 定植時にアザミウマ類に登録のある粒剤等を処理する。
 - (イ) 薬液が葉裏までかかるように丁寧に薬剤散布を行う。
 - (ウ) ミナミキイロアザミウマの卵・蛹には薬剤の効果が劣るので、発生圃場では5～7日間隔で2～3回防除する。
 - (エ) 雑草等でも増殖するので圃場内外の除草を徹底する。
 - (オ) 夏秋きゅうりでは、本虫はメロン黄化えそウイルス（MYSV）を媒介するので注意する。
- (4) コナジラミ類（夏秋トマト）
 - ア 予報の内容 発生量：やや多～多
 - イ 予報の根拠

(ア) 冬春トマトの5月中旬の調査では、オンシツコナジラミ、タバココナジラミとともにやや多の発生である。

(イ) 気象予報では、気温は高い、降水量はほぼ平年並とされており、発生にやや助長的である。

ウ 防除上の注意

(ア) 薬液が葉裏までかかるように丁寧に薬剤散布を行う。

(イ) 薬剤感受性の低下を防止するため、同一系統の薬剤の連用は避け、ローテーション使用とする。

(ウ) タバココナジラミは黄化葉巻ウイルス (TYLCV) を媒介するので注意する。

(エ) 多くの植物に寄生するため、圃場内外の除草を徹底する。

(5) アブラムシ類（野菜全般）

ア 予報の内容 発生量：やや多

イ 予報の根拠

(ア) 黄色粘着トラップによる有翅アブラムシの誘殺数は、平年並である（病害虫防除所ホームページ参照）。

(イ) 気象予報では、気温は高い、降水量はほぼ平年並とされており、発生にやや助長的である。

ウ 防除上の注意

(ア) 葉裏などをよく観察して早期発見に努め、寄生が見られたら早めに防除する。

(イ) アブラムシ類は多くのウイルスを媒介するので注意する。

(ウ) 定植時にアブラムシ類に登録のある粒剤等を処理する。

(6) ハスモンヨトウ、オオタバコガ、シロイチモジヨトウ（野菜全般）

ア 予報の内容 発生量：やや多～多

イ 予報の根拠

(ア) フェロモントラップでの誘殺数は、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、シロイチモジヨトウともにやや多～多である（病害虫防除所ホームページ参照）。

(イ) 気象予報では、気温は高い、降水量はほぼ平年並とされており、発生にやや助長的である。

ウ 防除上の注意

(ア) 多くの農作物を加害するので、対象とする農作物での発生の早期発見に努め、若齢幼虫期の防除を心掛ける。

(7) コナガ（アブラナ科野菜）

ア 予報の内容 発生量：やや多～多

イ 予報の根拠

(ア) 予察灯、フェロモントラップにおける誘殺数は、地点により差はあるが並～やや多である（病害虫防除所ホームページ参照）。

(イ) 気象予報では、気温は高い、降水量はほぼ平年並とされており、発生にやや助長的である。

ウ 防除上の注意

(ア) 殺虫剤抵抗性が極めて発達しやすいので、同一系統の薬剤を連用しない。

(イ) 収穫残渣を早期に処分し、次世代の発生源を放置しない。

(ウ) ジアミド系殺虫剤（フェニックス、プレバソソ等）の効果低下事例が県下で確認されていることから、これらの薬剤の使用は控える。

【病害虫発生予察情報】

愛媛県病害虫防除所ホームページでご覧になれます。

ホーム > 仕事・産業・観光 > 農業 > 鳥獣害・病害虫対策 > 愛媛県病害虫防除所
ホームページアドレスは <http://www.pref.ehime.jp/h35118/2406/byocyubojo/index.html>

【農薬使用時の注意】

- ◎農薬の選定にあたっては、農薬取締法に基づき登録された農薬から選定しましょう。
- ◎農作物の安全性を確保するため、農薬の使用にあたっては、適用作物、使用回数、
使用時期、使用濃度、使用量、使用方法等の使用基準を遵守しましょう。
- ◎病害虫等の発生を的確に把握し、適時適切な経済防除に努め、農薬や労力等の低投
入を図るとともに、低毒性農薬を使用しましょう。
- ◎農薬による防除のみに頼らず、耕種的防除法、物理的防除法及び天敵導入等を積極
的に取り入れた総合防除を推進しましょう。
- ◎同一薬剤の連用は耐性菌、抵抗性害虫の出現や助長をまねくので、農薬のローテー
ション使用を心掛けましょう。
- ◎農薬の使用にあたっては、当該散布場所の地形、当日の気象、養蚕、養蜂、その他の
環境条件を考慮し、周辺環境に影響の少ない薬剤を選定するとともに、危害の未
然防止や環境の保全に努め、農薬事故防止対策を徹底しましょう。
- ◎農薬を使用する際、農薬のラベルに記載された登録内容、使用上の注意事項等を遵
守し、農薬の散布にあたっては、農薬の種類に応じた保護具を必ず装着しましょう。

[表示事項の遵守]

- ① 適用がない食用農作物へは使用しないこと。
- ② 定められた使用量又は濃度を超えて使用しないこと。
- ③ 定められた使用時期（収穫前日数等）を守ること。
- ④ 定められた総使用回数以内で使用すること。