

薬生薬審発1115第3号
平成28年11月15日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
(公 印 省 略)

医薬品の一般的名称について

標記については、「医薬品の一般的名称の取扱いについて（平成18年3月31日薬食発第0331001号厚生労働省医薬食品局長通知）」等により取り扱っているところであるが、今般、我が国における医薬品一般的名称（以下「JAN」という。）について、新たに別添のとおり定めたので、御了知の上、貴管下関係業者に周知方よろしく御配慮願いたい。

（参照）

日本医薬品一般名称データベース：URL <http://jpdb.nihs.go.jp/jan/Default.aspx>
(別添の情報のうち、JAN以外の最新の情報は、当該データベースの情報で対応することとしています。)

別添

(別表2) INNに収載された品目の我が国における医薬品一般的の名称

(平成18年3月31日薬食審査発第0331001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知に示す別表2)

登録番号 27-4-B8

JAN(日本名) : オリプダーゼ アルファ(遺伝子組換え)




JAN(英名) : Olipudase Alfa (Genetical Recombination)

アミノ酸配列及びジスルフィド結合

HPLSPQGHPA RLH RIV PRLR DVFGWGNLTC PICKGLFTAI NLGLKKEPNV
ARVGGSVAIKL CNLLKIAPPA VCQSIVHLFE DDMVEVWRRS VLSPSEACGL
LLGSTCGHWD IFSSWNISLP TVPKPPPKPP SPPAPGAPVS RILFLTDLHW
DH DYLEGTDP DCADPLCCRR GSGLPPASRP GAGYWGEYSK CDLPLRTLES
LLSGLGPAGP FDMVYWTGDI PAHDVWHQTR QDQLRALTTV TALVRKFLGP
VPVYPAVGNH ESTPVNSFPP PFIEGNHSSR WLYEAMAKAW EPWLPAEALR
TLRIGGFYAL SPYPGLRLIS LNMNFC SREN FWLLINSTDP AGQLQWLVGE
LQAAEDRGDK VHIIGHIPPG HCLKSWSWNY YRIVARYENT LAAQFFGHTH
VDEFEVFYDE ETLSRPLAVA FLAPSATTYI GLNPGYRVYQ IDGNYSGSSH
VVLDHETYIL NLTQANIPGA IPHWQLLYRA RETYGLPNTL PTAWHNLVYR
MRGDMQLFQT FWFLYHKGHP PSEPCGTPCR LATLCAQLSA RADSPALCRH
LMPDGSLPEA QSLWPRPLFC

H1:部分的プロセシング; N27, N116, N276, N336, N444, N461:糖鎖結合

主な糖鎖の推定構造：



C₂₉₀₀H₄₃₇₃N₇₈₃O₇₉₁S₂₄ (タンパク質部分)

オリップダーゼ アルファは遺伝子組換えヒトスフィンゴミエリンホスホジエステラーゼ類縁体であり、ヒトスフィンゴミエリンホスホジエステラーゼの 14~583 番目のアミノ酸に相当する。オリップダーゼ アルファは、チャイニーズハムスター卵巣細胞により產生される、570 個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質（分子量：約 76,000）である。

Olipudase Alfa is a recombinant human sphingomyelin phosphodiesterase analog corresponding to amino acids 14–583 of human sphingomyelin phosphodiesterase. Olipudase Alfa is produced in Chinese hamster ovary cells, which is a glycoprotein (molecular weight: ca. 76,000) consisting of 570 amino acid residues.

登録番号 28-1-B5

JAN (日本名) : エミシズマブ (遺伝子組換え)

JAN (英 名) : Emicizumab (Genetical Recombination)

アミノ酸配列及びジスルフィド結合 :

L鎖

DIQMTQSPSS	LSASVGDRVT	ITCKASRNIE	RQLAWYQQKP	GQAPELLIYQ
ASRKESGVPD	RFSGSRYGTD	FTLTISSSLQP	EDIATYYCQQ	YSDPPLTFGG
GTKVEIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNNFY	PREAKVQWKV
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYSLSSTLT	LSKADYEKHK	VYACEVTHQG
LSSPVTKSFN	RGEC			

抗 FIXa-H 鎖

QVQLVESGGG	LVQPGGSLRL	SCAASGFTFS	YYDIQWVRQA	PGKGLEWVSS
ISPAGQSTYY	RREVKGRTI	SRDNSKNLY	LQMNSLRAED	TAVYYCARRT
GREYGGGWYF	DYWGQGTLVT	VSSASTKGPS	VFPLAPCSRS	TSESTAALGC
LVKDYFPEPV	TVSWNSGALT	SGVHTFPABL	QSSGLYSLSS	VVTVPSSSLG
TQTYTCNVDH	KPSNTKVDKR	VESKYGPPCP	PCPAPEFLGG	PSVFLFPPKP
KDTLMISRTP	EVTCVVVVDVS	QEDPEVQFNW	YVDGVEVHNA	KTKPREEQYN
STYRVVSVLT	VLHQDWLNGK	EYKCKVSNKG	LPSSIEKTIS	KAKGQPREPQ
VTYTLPPSQKE	MTKNQVSLTC	LVKGFYPSDI	AVEWESNGQP	ENNYKTTPPV
LSDGGSFFLY	SKLTVDKSRW	QEGNVFSCSV	MHEALHNRYT	QKSLSLSP


抗 FX-H 鎖

QVQLVQSGSE	LKKPGASVKV	SCKASGYTFT	DNNMDWVRQA	PGQGLEWMGD
INTRSGGSIY	NEEFQDRVIM	TVDKSTDAY	MELSSLRSED	TATYHCARRK
SYGYYLDEWG	EGTLVTVSSA	STKGPSVFPL	APCSRSTSSES	TAALGCLVKD
YFPEPVTVSW	NSGALTSGVH	TFPAVLQSSG	LYSLSSVVTV	PSSSLGTQTY
TCNVDHKPSN	TKVDKRVESK	YGPPCPPCPA	PEFLGGPSVF	LFPPPKDSDL
MISRTPEVTG	VVVDVSQEDP	EVQFNWYVDG	VEVHNAKTP	REEQYNSTYR
VVSVLTVLHQ	DWLNGKEYKC	KVSNKGLPSS	IEKTISKAKG	QPREPQVYTL
PPSQEEMTKN	QVSLTCLVKG	FYPSDIAVEW	ESNGQPENNY	KTPPPVLDSD
GSFFLYSKLT	VDKSRWQEGN	VFSCSVMHEA	LHNHYTQESL	SLSP

抗 FIXa-H 鎖 Q1, 抗 FX-H 鎖 Q1 : 部分的ピログルタミン酸 ; 抗 FIXa-H 鎖 N300, 抗 FX-H 鎖 N296 : 糖鎖結合

L鎖 C214 – 抗 FIXa-H 鎖 C137, L鎖 C214 – 抗 FX-H 鎖 C133, 抗 FIXa-H 鎖 C229 – 抗 FX-H 鎖 C225, 抗 FIXa-H 鎖 C232 – 抗 FX-H 鎖 C228 : ジスルフィド結合

主な糖鎖の推定構造：



C₆₄₃₄H₉₉₄₀N₁₇₂₄O₂₀₄₇S₄₅ (タンパク質部分, 4本鎖)

抗 FX-H 鎮 : C₂₁₆₄H₃₃₃₄N₅₇₂O₆₉₀S₁₈

抗 FIXa-H 鎮 : C₂₂₀₄H₃₃₈₆N₅₈₈O₆₇₉S₁₅

L 鎮 : C₁₀₃₃H₁₆₁₄N₂₈₂O₃₃₉S₆


エミシズマブは、遺伝子組換えヒト化二重特異性モノクローナル抗体であり、ラット抗ヒト活性型血液凝固第 IX 因子 (FIXa) 抗体及びマウス抗ヒト血液凝固第 X 因子 (FX) 抗体の相補性決定部、ヒトフレームワーク部及びヒト IgG4 の定常部からなる。抗 FIXa-H 鎮の 202, 231, 299, 359, 412, 438 と 448 番目のアミノ酸残基はそれぞれ Gln, Pro, Tyr, Lys, Lys, Arg と Pro に置換され、C 末端の Gly と Lys は除去されている。また、抗 FX-H 鎮の 198, 227, 295, 408, 438 と 444 番目のアミノ酸残基はそれぞれ Gln, Pro, Tyr, Lys, Glu と Pro に置換されており、C 末端の Gly と Lys は除去されている。エミシズマブは、チャイニーズハムスター卵巣細胞により產生される。エミシズマブは、448 個のアミノ酸残基からなる抗 FIXa-H 鎮 ($\gamma 4$ 鎮) 1 本、444 個のアミノ酸残基からなる抗 FX-H 鎮 ($\gamma 4$ 鎮) 1 本及び 214 個のアミノ酸残基からなる L 鎮 (κ 鎮) 2 本で構成される糖タンパク質（分子量：約 148,000）である。

Emicizumab is a recombinant bispecific humanized monoclonal antibody composed of complementarity-determining regions derived from rat anti-human blood coagulation factor IXa (FIXa) antibody and mouse anti-human blood coagulation factor X (FX) antibody, human framework regions and human IgG4 constant regions. In the anti-FIXa H-chain, the amino acid residues at position 202, 231, 299, 359, 412, 438 and 448 are substituted by Gln, Pro, Tyr, Lys, Lys, Arg and Pro, respectively, and Gly and Lys at the C-terminal are deleted. In the anti-FX H-chain, the amino acid residues at position 198, 227, 295, 408, 438 and 444 are substituted by Gln, Pro, Tyr, Lys, Glu and Pro, respectively, and Gly and Lys at the C-terminal are deleted. Emicizumab is produced in Chinese hamster ovary cells. Emicizumab is a glycoprotein (molecular weight: ca. 148,000) composed of an anti-FIXa H-chain ($\gamma 4$ -chain) consisting of 448 amino acid residues, an anti-FX H-chain ($\gamma 4$ -chain) consisting of 444 amino acid residues and 2 L-chains (κ -chains) consisting of 214 amino acid residues each.

登録番号 28-1-B7

JAN (日本名) : シプロフロキサシン水和物

JAN (英 名) : Ciprofloxacin Hydrate



$\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{FN}_3\text{O}_3 \cdot 3\frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$


1-シクロプロピル-6-フルオロ-4-オキソ-7-(ピペラジン-1-イル)-1,4-ジヒドロキノリン-3-カルボン酸 ヘミ
ヘプタ水和物

1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hemiheptahydrate

登録番号 28-2-B2

JAN (日本名) : ベネトクラクス

JAN (英 名) : Venetoclax



C₄₅H₅₀ClN₇O₇S


4-(4-{[2-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチルシクロヘキサ-1-エン-1-イル]メチル}ピペラジン-1-イル)-N-[(3-ニトロ-4-{[(オキサン-4-イル)メチル]アミノ}フェニル)スルホニル]-2-[(1*H*-ピロロ[2,3-*b*]ピリジン-5-イル)オキシ]ベンズアミド

4-(4-{[2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-
N-[(3-nitro-4-{[(oxan-4-yl)methyl]amino}phenyl)sulfonyl]-2-[(1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin-5-yl)oxy]benzamide

登録番号 28-3-B3

JAN (日本名) : ボルテゾミブ水和物

JAN (英 名) : Bortezomib Hydrate



C₁₉H₂₅BN₄O₄ · H₂O

{(1*R*)-3-メチル-1-[(2*S*)-3-フェニル-2-(ピラジン-2-カルボキサミド)プロパンアミド]ブチル}ボロン酸 一水和物

{(1*R*)-3-Methyl-1-[(2*S*)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)propanamido]butyl}boronic acid monohydrate

※ JAN 以外の情報は、参考として掲載しました。